

Designação	Descrição
AAS	Analgésico e Antipirético. Anti-inflamatório não esteróide. Dor ligeira a moderada; piroxia. Profilaxia secundária de acidentes cardio e cerebrovasculares isquémicos.
Acetazolamida	Inibidor da anidrase carbónica. Redução da pressão intra-ocular em glaucoma de ângulo aberto, glaucoma secundário e no perioperatório do glaucoma de ângulo fechado. Hipertensão pulmonar.
Acetilcisteína	Mucolítico. A Acetilcisteína é um aminoácido sulfurado que se caracteriza pela sua acção fluidificante sobre as secreções mucosas e mucopurulentas.
Aciclovir	Antivírico. Profilaxia e tratamento das infecções devidas a Herpes simplex, incluindo o herpes genital primário e recidivante. Tratamento das infecções devidas ao vírus Varicella-zoster.
Ácido Alendrónico	Bifosfonato. Utilizado no tratamento da osteoporose pos-menopausica. Reduz risco de fracturas vertebrais e da anca.
Ácido Aminocaprílico	Anti-hemorrágicos / Antifibrinolíticos. Tratamento e profilaxia das hemorragias associadas a uma fibrinólise excessiva.
Ácido Fólico	O ácido fólico, folacina ou ácido pteroil-L-glutâmico, também conhecido como vitamina B9 ou vitamina M, é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo B necessária para a formação de proteínas estruturais e hemoglobina.
Ácido Ibandrónico	Bonviva. Tratamento da osteoporose pós-menopausa.
Ácido Valprórico	Valproato de sódio. Antiepiléptico e Anticonvulsivante. Utilizado na epilepsia. Tem acção sobre o humor nas psicoses maníaco-depressivas; útil na profilaxia da enxaqueca.
Actrapid	insulina de acção rápida
Adalat	Nifedipina. Bloqueador dos canais de cálcio. Antihipertensor. Indicações: HTA e HTA gravidez, tratamento angina de peito.
Albendazol	antiparasitário e anti-helmintico
Aldactone	Espironolactona. Diurético de estrutura esteróide poupador de potássio. Edemas associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, síndrome nefrótica. Hiperaldosteronismo primário (diagnóstico e tratamento) e hiperaldosteronismo secundário. Hipertensão arterial. Tratamento e prevenção de hipocaliémia nas situações em que os suplementos de potássio sejam considerados inadequados.
Alphagan	Tartarato de brimonidina. Colírio. Redução da pressão intra-ocular elevada em doentes com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular. Como monoterapia em doentes em que a terapêutica betabloqueadora tópica está contra-indicada.
Alprazolam	Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Benzodiazepina. Ansiedade e sintomas ansiosos; ataques de pânico.
Aminofilina	Xantina. broncodilatador que derivado do teofilinato de etilenodiamina. Prevenção das crises e tratamento do ataque agudo de asma; obstrução reversível das vias aéreas.
Amlopidina	Antihipertensor e antianginoso. Bloqueador de cálcio que actua através do relaxamento do músculo vascular liso.
Arginina	A arginina é um aminoácido essencial, precursor do óxido nítrico, que tem sido associado à redução da pressão arterial, redução da coagulação sanguínea e protecção contra enfarte do miocárdio e ataque cardíaco. Utilizado como suplemento proteico em doentes com hipoproteínemia, perda de peso, e feridas.
Atarax	Hidroxizina. Ansiolítico e Antihistamínico. O Atarax está indicado: no tratamento sintomático da ansiedade, nos adultos; no tratamento sintomático do prurido; na pré-medicação em cirurgia.
Atrovent	Brometo de Ipatrópio. Broncodilatador. composto de amónio quaternário com propriedades anticolinérgicas (parassimpaticolíticas).

Augmentin Duo	Amoxicilina+Ac. Clavulânico. Associação de penicilina com inibidor da lactamase beta. Indicado no tratamento de Infecções respiratórias. Bronquite crónica. Otite média. Sinusite. Infecções urinárias. Infecções por Salmonella. Gonorreia. Pode ser útil no tratamento de infecções respiratórias por H. influenzae resistentes à ampicilina/amoxicilina, particularmente em doentes com DPOC.
Azopt	Brinzolamida. Inibidor da anidrase carbónica. Diminuição da pressão intraocular em hipertensão ocular e glaucoma de ângulo aberto.
Bactrim	Antiinfeccioso. Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim). Indicado na profilaxia de infecção urinária em doentes algaliados, Infecções urinárias. Infecções devidas a Salmonella spp. Prostatites. Infecções devidas a Pneumocystis carinii.
Beclometazona	corticosteroides (inalação e nasal)
Betaserc	Antieméticos e antivertiginosos / Beta-histina. Indicado para Vertigem de causa periférica, incluindo síndrome de Menière.
Bisacodil	Laxante de contacto. El bisacodilo actúan estimulando el peristaltismo intestinal aumentando la contracción muscular de la pared intestinal, lo que favorece los movimientos de evacuación desplazando la masa fecal. Se debe tomar con el estómago vacío ya que los alimentos retrasan su acción.
Bisoprolol	Antihipertensor. Depressores actividade adrenérgica/Bloqueadores beta /Selectivos cardíacos.
Brinzdamida + azoptcolírio	indicado para diminuir a pressão intra-ocular em caso de: glaucoma ou hipertensão intra-ocular.
Bromazepam	Lexotan. Ansíolítico, sedativo e hipnótico. Benzodiazepina. Indicado para a Ansiedade e sintomas ansiosos. Depressor do SNC. Em doses baixas, reduz selectivamente a tensão e a ansiedade; em doses altas, promove efeito sedativo e relaxante muscular.
Budesonido	Antiasmático e broncodilatador. Pulmicort. Glucocorticosteroide antiinflamatório. Usado na rinite alérgica. Minimiza inflamação e edema da mucosa nasal.
Butilescopolamina	Antiespasmódico: acção espasmolítica sobre a musculatura lisa do aparelho gastrointestinal e das vias biliares e genito-urinárias. A acção anticolinérgica periférica resulta da acção bloqueadora dos gânglios na parede visceral, assim como da actividade antimuscarínica. O efeito anticolinérgico deste fármaco controla o estertor, sintoma frequente na fase de agonia.
Carbamazepina	Antiepilépticos e anticonvulsivantes. Na epilepsia: nas crises parciais e nas crises tónico-clónicas. Como estabilizador do humor nas psicoses maniaco-depressivas. Nevralgia do trigémeo.
Carvedilol	Antihipertensor. Depressores act adrenérgica, Bloqueadores beta e alfa.
Catalip	Antidislipidémico. Fibrato. Indicado no tratamento de Hipertrigliceridémia e dislipidémia mista.
Cefradur (cefradina)	antibacteriano – cefalosporina de 1ª geração
Cetirizina	Antihistamínico. Cetirizina. Selectivos receptores histamina H1. Produza sonolência reduzida.
Ciamemazina	Antipsicótico. Tratamento sintomáticos das psicoses.
Cinarizina	Cinarizina é um vasodilatador cerebral, derivado da piperazina, que bloqueia os canais de cálcio. É um bloqueador dos receptores H ₁ da histamina. Usado no tratamento de vertigens, aterosclerose cerebral, cefaleias crónicas, alterações de memória, transtornos do sono ou diminuição da capacidade cognitiva.
Cipralex	Escitalopram. Antidepressor. Inibidores selectivo da recaptção da serotonina (ISRS). Tratamento da depressão (episódios major) e perturbações da ansiedade.
Ciprofloxacina	Medicamentos antiinfecciosos. Quinolona. As quinolonas são antimicrobianos estruturalmente relacionados com o ácido nalidíxico. A sua actividade bactericida resulta da inibição da girase do ADN, enzima essencial à replicação e transcrição do ADN bacteriano. Apresentam um espectro de actividade que abrange muitos microrganismos gram + e gram - incluindo estafilococos resistentes à meticilina e Pseudomonas aeruginosa.

Citricolina	Somazina. produto biológico, que aumenta a síntese dos fosfolípidos. A citicolina actua na regeneração das membranas celulares com efeito benéfico, em casos de edema e hipóxia. Actua também ao nível dos neurotransmissores com um aumento de produção da dopamina e como um activador do estado de alerta com um efeito importante na resposta cortical directa.
Claritromicina	Antibacterianos / Macrólidos. Infecções respiratórias. Infecções da pele e tecidos moles. Tratamento da úlcera péptica (erradicação do <i>Helicobacter pylori</i>) em associação com outros antimicrobianos e inibidores da secreção ácida gástrica
Clopidogrel	Antiagregante plaquetário. Usa-se na profilaxia de doentes com afecções tromboembólicas (enfarte agudo do miocárdio e acidente trombótico cerebral).
Clorocil	Cloranfenicol. Colírio/pomada oftálmica. Antibacteriano. Tratamento de infecções superficiais (blefarites e conjuntivites) ou de úlceras da córnea de origem bacteriana
CoAprovel	Hidroclorotiazida + Irbesartan. Tratamento da hipertensão essencial em doentes em que a pressão arterial não é adequadamente controlada pelo irbesartan ou pela hidroclorotiazida em monoterapia.
Combivent	Brometo de Ipatrópio+Salbutamol. I- Broncodilatador. composto de amónio quaternário com propriedades anticolinérgicas (parassimpaticolíticas). II- β_2 -adrenérgico que actua na musculatura lisa das vias aéreas, causando o seu relaxamento, desde a traqueia até aos bronquíolos terminais e protege contra os estímulos broncoconstritores.
Cosopt	Colírio. Cloridrato de dorzolamida e maleato de timolol. Diminuição da hipertensão intra-ocular.
Cotrimoxazol	(Sulfametoxazol + Trimetoprim). Bactrim. Antiinfecioso. Indicado na profilaxia de infecção urinária em doentes algaliados, Infecções urinárias. Infecções devidas a <i>Salmonella</i> spp. Prostatites. Infecções devidas a <i>Pneumocystis carinii</i> .
Crestor	Antidislipidémico. Rosuvastatina. Inibidor selectivo e competitivo da HMGCoA redutase.
Daflon	Venotrópico pertencente ao grupo dos Bioflavonóides. Tratamento Insuficiência venosa. vasopressor e vasoprotector - exerce uma ação sobre o sistema vascular de retorno: ao nível das veias, diminui a distensibilidade venosa e reduz a estase venosa; ao nível da microcirculação, normaliza a permeabilidade capilar e reforça a resistência capilar.
Deflazacorte	Glucocorticóide. No controlo de doenças inflamatórias e alérgicas; edema cerebral; doença reumática em doentes idosos e crianças.
Dexametasona	Hormona cortico-suprarrenal com actividade predominantemente glucocorticóide. Tem acções anti-inflamatória e imunossupressora muito elevadas e escassa acção mineralocorticóide.
Diclofenac	Anti-inflamatórios não esteróides / Derivados do ácido acético. Voltaren. Aplicação a nível do aparelho loco motor - afecções musculares e articulares.
Dimeticone	Antiflatulento, substância quimicamente inerte que actua modificando a tensão superficial das bolhas gasosas e através deste mecanismo desenvolve uma eficaz acção antiespuma
Domperidona	Antiemético. Modificador da motilidade intestinal/Procinético. Tratamento sintomático de náuseas e vómitos de origem central e periférica.
Donepezilo	tratamento sintomático da Demência de Alzheimer ligeira a moderadamente grave
Donepezilo	inibidor da acetilcolinesterase (demência de Alzheimer)
Ebixa	Memantina. Tratamento sintomático da doença de Alzheimer moderada a grave.
Ebixa (memantina)	medicamentos utilizados no tratamento DA
Enalapril	Antihipertensor. Hipotensor. Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

Enoxaparina	Heparina de Baixo Peso Molecular. Profilaxia de acidentes tromboembólicos venosos.
Entirox	(levotiroxina sódica) hormonas da tiroide e anti tiroideus
Escitalopram	Ciprexal. Antidepressor. Inibidores selectivo da recaptção da serotonina (ISRS). Tratamento da depressão (episódios maior) e perturbações da ansiedade.
Esomeprazol	Inibidor da bomba de protões. Actua na diminuição da acidez gástrica. Utilizado como protector gástrico em doentes polimedicados.
Fenitoína	Hidantina. Antiepilépticos e anticonvulsivantes. Na epilepsia: nas crises parciais e nas crises tónico-clónicas. Nevralgia do trigémeo.
Fitomenadiona	Anti-hemorrágicos / Hemostáticos. Hemorragias por excesso de dosagem de antivitamínicos K; profilaxia da doença hemorrágica do RN (em particular dos prematuros e nos doentes das unidades de cuidados intensivos) pela dieta pobre, na nutrição parenteral, na uremia.
Floxapen	Antibiótico. Isoxazolilpenicilinas / Flucloxacilina. Utilizado em afecções cutâneas/tecidos moles.
Formoterol	Antiasmáticos e broncodilatadores / Agonistas adrenérgicos beta. Tratamento da asma e das doenças crónicas obstrutivas das vias aéreas, particularmente no controlo dos sintomas da asma nocturna e na profilaxia do broncospasma induzido pelo exercício físico.
Fortimel	O Fortimel é o seu suplemento nutricional oral, de alto valor proteico e isento de glúten, com 20g de proteína e 200 kcal numa embalagem de 200 ml
Frisolona	Prednisolona utilizada em afecções oculares. Corticosteroide. Como anti-inflamatório em caso de uveíte, esclerite e na redução da inflamação após cirurgias oculares.
Fucidine	Antibacteriano. Infecções devidas a estafilococos resistentes às penicilinas, particularmente osteomielites (boa difusão no tecido ósseo) e infecções da pele e tecidos moles.
Furosemida	Diurético da ansa, indicada na remoção de edema causado por IC (nomeadamente o edema pulmonar) e por doenças hepáticas ou renais.
Gabapentina	Antiepiléptico. Tratamento da epilepsia em monoterapia e terapia de adjução nas crises epilépticas parciais ou parciais secundariamente generalizadas. Dor neuropática.
Glicazida	Antidiabético oral.
Haldol	Haloperidol. Antipsicótico. Utilizado na esquizofrenia e outras psicoses. Tiques e síndrome de Gilles de la Tourette. Actividade antiemética. Adjuvante no tratamento da dor crónica grave.
Haloperidol	Antipsicótico. Utilizado na esquizofrenia e outras psicoses. Tiques e síndrome de Gilles de la Tourette. Actividade antiemética. Adjuvante no tratamento da dor crónica grave.
Hidantina	Fenitoína. Antiepilépticos e anticonvulsivantes. Na epilepsia: nas crises parciais e nas crises tónico-clónicas. Nevralgia do trigémeo.
Hidrocortisona	Gluococorticoide. Hormona cortico-suprarrenal com acções anti-inflamatória e imunossupressora por inibição da síntese das prostaglandinas e leucotrienos que medeiam os processos vasculares e celulares da inflamação.
Hidrosmina	Venotrópico biflavonóide. Produto de síntese correspondente à hidroxietildiosmina, tratamento do insuficiência venosa.
Hidroxicloroquina	Antiparasitário. Antimalárico. Usado como terapia antiviral em doentes com VIH em países subdesenvolvidos. Utilizado no tratamento de Lúpus eritematoso e artrite reumatóide.
Hidroxizina	Atarax. Ansiolítico e Antihistamínico. O Atarax está indicado: no tratamento sintomático da ansiedade, nos adultos; no tratamento sintomático do prurido; na pré-medicação em cirurgia.

Hylo-Care	Utilizado como lubrificante e hidratante ocular.
Indapamida	diurético (tipo tiazídico) e antihipertensor
Insulatard	insulina de acção prolongada
Keppra	Levetiracetam. anti-epiléptico
Kreon	Suplementos enzimáticos aparelho digestivo: Pancreatina, indicada nas situações de diminuição ou ausência de secreção exócrina (fibrose quística, após pancreatectomia, gastrectomia total, pancreatite crónica).
Lactulose	Laxante osmótico. No cólon, é decomposta em ácidos orgânicos de baixo peso molecular, que levam a uma redução do pH no lumen do cólon e, devido a um efeito osmótico, a um aumento do conteúdo do cólon.
Lanoxin	Digoxina. Digitálico. Cardiotónico. IC, fibrilhação e flutter auriculares. Excreção renal.
Ledertrexato	Metotrexato. Antineoplásico e Imunomodulador. Indicado no tratamento de doenças neoplásicas.
Letter	Levotiroxina Sódica. Antitiroideu. Indicado no Hipotiroidismo.
Loperamida	Imodium. Antidiarreico. Terapêutica Obstipante.
Levomenoprazina	A phenothiazine with pharmacological activity similar to that of both CHLORPROMAZINE and PROMETHAZINE. It has the histamine-antagonist properties of the antihistamines together with CENTRAL NERVOUS SYSTEM effects resembling those of chlorpromazine.
Lexotan	Bromazepam
Lisinopril	Antihipertensor. Hipotensor. Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.
Lodertrexato	Metotrexato ou MTX é um antimetabólito e uma droga antifolato usada no tratamento do câncer e doenças autoimunes. Essa droga age inibindo o metabolismo do ácido fólico.
Lopiretic	Captopril + Hidroclorotiazida. Associação de inibidor da Enzima de Conversão da Angiotensina (ECA) e diurético tiazídico.
Lorazepam	Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos / Benzodiazepina. Indicado na Ansiedade e sintomas ansiosos; insónia (tratamento a curto prazo); terapêutica adjuvante da anestesia; estado de mal epiléptico.
Losartan	Antagonistas dos receptores da angiotensina
Lovenox	Heparina de Baixo Peso Molecular. Profilaxia de acidentes tromboembólicos venosos.
Lyrica	Pregabalina. Analgésico. Tratamento da dor neuropática. Anticonvulsivante e Antiepiléptico, indicado como terapêutica adjuvante no tratamento das crises parciais com ou sem generalização em adultos.
Metamizol Magnésico	Nolotil. Dolocalma. Analgésico, antipirético e espasmolítico. É um derivado pirazolónico inibidor do enzima ciclooxigenase o que se traduz por inibição da síntese das prostaglandinas. Tratamento da dor aguda no período pós-operatório ou pós-traumático; dores espasmódicas; dor tumoral; febre alta.
Metformina	Antidiabético oral. Hipoglicemiante. Antidiabético oral derivado da biguanida. Actua por um mecanismo triplo: atraso da absorção da glicose a nível intestinal, redução da produção hepática de glucose por inibição da glicogenólise e aumento, no músculo, da sensibilidade à insulina. Terapêutica de primeira linha em doentes obesos. Facilita perda de peso.
Metilprednisolona	Hormona cortico-suprarrenal com acções anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica acentuadas e de efeito prolongado, por inibição da síntese das prostaglandinas e leucotrienos que medeiam os processos vasculares e celulares da inflamação.

Metoclopramida	Antiemético e procinético pertencente ao grupo das ortopramidas. Bloqueia os receptores D2 da dopamina interferindo, ao nível central, com a integração dos impulsos emetógenos aferentes (efeito antiemético) e, aumentando ao nível periférico o peristaltismo intestinal (efeito procinético).
Metolazona	diurético (tiazídico) e antihipertensor
Metronidazol	anti-infeccioso (vários). Utilizado no tratamento de feridas para diminuição do odor.
Mianserina	Tolvon. antidepressivos tricíclicos
Midazolam	Ansiolítico benzodiazepínico de acção curta. Actua aumentando a actividade do ácido gama-aminobutírico (GABA) ao facilitar a sua união com o receptor gabaérgico. Possui actividade ansiolítica, anticonvulsivante, relaxante muscular e uma acção amnésica mais potente que o diazepam.
Midriodavi	Ciclopentolato. Antagonista muscarínico (parassimpaticolítico) com acção cicloplégica e midriática. A administração oftálmica do medicamento produz bloqueio dos receptores muscarínicos situados no músculo liso do esfíncter da íris e do músculo do corpo ciliar originando relaxe deste músculo (midríase) e perda da acomodação (cicloplegia) sendo o olho incapaz de se adaptar à visão perto.
Moduretic	diurético poupador de potássio
Naloxona	Utilizado na reversão da depressão opiácea, diagnóstico de suspeita de intolerância aos opiáceos, sobredosagem aguda aos opiáceos.
Neo-davisolona	(neomicina + penisolona): neomicina (aminoglicóideo), prednisolona (corticoide de média duração)
Neo-davisrona	Colírio para aplicação oftálmica. Associado de corticóide. Antiinflamatório e antiinfeccioso.
Nifedipina	Adalat. Bloqueador dos canais de cálcio. Antihipertensor. Indicações: HTA e HTA gravidez, tratamento angina de peito.
Nimesulida	A nimesulida é um fármaco Anti-Inflamatório Não Esteróide (AINE), que pertence ao grupo das sulfonamidas e que apresenta um mecanismo de acção multifactorial (inibidor COX-2).
Nistatina	Antifúngico. Profilaxia e tratamento de candidíases orais, esofágicas e intestinais (utilização exclusivamente tópica)
Nolotil	Metamizol Magnésico.
Nortriptilina	Antidepressivo Tricíclico. Indicado para a Depressão, enurese nocturna nas crianças.
Nortriptilina	Antidepressor Tricíclico. Depressão, enurese nocturna nas crianças.
Omeprazol	Inibidor da bomba de protões. Actua na diminuição da acidez gástrica. Utilizado como protector gástrico em doentes polimedicados. Úlcera péptica, esofagite de refluxo, síndrome de Zollinger Ellison. Erradicação do H. pylori em associação.
Otoceril	Facilitar remoção do cerumen. O para-diclorobenzeno tem como função a dissolução da cera, a benzocaína actua como anestésico local e o clorobutanol devido às suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, actua como antisséptico para o canal auditivo.
Oxitriptano	Percursor biológico da serotonina. Indicado na terapêutica profilática da enxaqueca, cefaleias recorrentes, mistas e de tensão.
Oxitriptano	percursor biológico da serotonina. Possui a propriedade de poder atravessar facilmente as membranas celulares e em especial, as das células cerebrais. Indicações terapêuticas. Indicado na terapêutica profilática da enxaqueca, cefaleias recorrentes, mistas e de tensão.
Paracetamol	Acetaminofeno. Analgésico e antipirético. Dor ligeira a moderada; pirexia.
Paroxetina	Antidepressivo que actua facilitando de forma selectiva a neurotransmissão serotoninérgica mediante a inibição da recaptação sináptica da serotonina. É um análogo da fluoxetina.

Paroxetina	Antidepressores / Inibidores selectivos de recaptção da serotonina (ISRS). Depressão, doença obsessiva-compulsiva; ansiedade generalizada, perturbações de pânico.
Pentoxifilina	vasodilatador e antiagregante plaquetário e pela redução da hiperviscosidade sanguínea.
Perindopril	Anti-hipertensivo inibidor do enzima de conversão da angiotensina (IECA); conduz à diminuição dos níveis de angiotensina II e aldosterona com a consequente redução da resistência vascular periférica e da retenção de sódio e diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica.
Picossulfato de sódio	Gutalax. Laxante de contacto.
Piperaciclina	Antibacteriano. Penicilina Antipseudomonas. Utilizado no tratamento de infecções graves devidas a gram - multirresistentes, incluindo a Pseudomonas aeruginosa.
Plavix	Clopidogrel. Antiagregante plaquetário. Usa-se na profilaxia de doentes com afecções tromboembólicas (enfarte agudo do miocárdio e acidente trombótico cerebral).
Prednifalmina	Antiifeccioso ocular. Antiinflamtório Corticosteróide. Indicada no tratamento tópico das infecções oculares causadas por microorganismos sensíveis ao cloranfenicol e que requerem a associação de um corticosteróide, para alívio da inflamação que acompanha a infecção ocular.
Prednisolona	É um corticosteróide de síntese usado principalmente pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Na insuficiência adrenocortical; reacções de hipersensibilidade tais como choque anafilático e angiedema; doença inflamatória do intestino; doença reumática; doenças de pele.
Pregabalina	Analgésico. Tratamento da dor neuropática. Anticonvulsivante e Antiepiléptico, indicado como terapêutica adjuvante no tratamento das crises parciais com ou sem generalização em adultos.
Quetiapina	Antipsicótico. Indicado na Esquizofrenia e outras psicoses.
Ramipril	IECA
Ranelato de Estrôncio	O ranelato de estrôncio é utilizado para o tratamento da osteoporose nas mulheres pós-menopáusicas, para redução do risco de fracturas vertebrais e do colo do fémur.
Ranitidina	antiulceroso (inibidor da secreção gástrica de ácido)
Risperidona	Antipsicótico. indicado para o tratamento de uma grande variedade de doentes com esquizofrenia, alivia os sintomas afectivos, indicado para o tratamento de perturbações no comportamento em doentes com demência em que sejam dominantes sintomas tais como agressividade, tratamento da mania na doença bipolar.
Sene	Pursenide. Estimulante da motilidade intestinal.
Sertralina	Antidepressivo, derivado da naftalenamina. Actua inibindo de forma selectiva a recaptção da serotonina na membrana presináptica neuronal, assim potenciando o efeito do neurotransmissor.
Sertralina	antidepressivos (inibidor selectivo da recaptção da serotonina- ISRS)
Sinemet	Antiparkinsonico. Associação de Levodopa + Carbidopa.
Singular	Montelucaste. antagonista dos leucotrienos (anti-inflamatório)
Sinvastatina	Antidislipidémico. Diminui os níveis de LDL no sangue e aumenta os níveis de HDL.
Sirdalud	Tizanidina, relaxante muscular de acção central
Stugeron	Cinarizina é um vasodilatador cerebral, derivado da piperazina, que bloqueia os canais de cálcio. É um bloqueador dos receptores H1 da histamina. Usado no tratamento de vertigens, aterosclerose cerebral, cefaleias crónicas, alterações de memória, transtornos do sono ou diminuição da capacidade cognitiva.

Sucralfato	Anti-ácido e anti-ulceroso. Protector da mucosa gástrica. Indicado no tratamento da Úlcera péptica.
Sulfato Ferroso	Antianémico, composto de ferro. Indicado no tratamento de Anemias por défice de ferro.
Tansulosina	Medicamento utilizado na retenção urinária. Bloqueador adrenérgico alfa-1 indicado em caso de hiperplasia benigna da próstata.
Tazobac	Piperacilina + Tazobactam. Antibacteriano. Indicado no tratamento de infecções bacterianas locais e/ou sistémicas onde foram detectados ou se suspeita da presença de microrganismos susceptíveis (Infecções das vias respiratórias inferiores, das vias urinárias, pele e tecidos moles, etc.)
Timoptol	Maleato de timolol, beta-bloqueador oftálmico receitado para baixar a pressão elevada nos olhos (pressão intra-ocular), no tratamento do glaucoma e/ou da hipertensão ocular.
Tizanidina	relaxante muscular de acção central
Tolvon	Mianserina. antidepressivos triciclicos
Tramadol	Analgésico opióide fraco. Degrau II. Dor moderada a grave.
Transtec	Buprenorfina. Analgésico opióide forte. Degra III. Agonista/antagonista opiáceo que se liga aos receptores μ e k do cérebro. Alívio da dor intensa. Terapêutica de substituição em caso de toxicoddependência de opióides.
Trazadone	Triticum; tratamento da depressão associada ou não a estados de ansiedade.
Trental	Pentoxifilina. vasodilatador e antiagregante plaquetário e pela redução da hiperviscosidade sanguínea.
Trimetropina	Antibiótico bacteriostático usado na profilaxia e tratamento de infecções do trato urinário.
Triticum	Trazadone; tratamento da depressão associada ou não a estados de ansiedade.
Urispas	Flavoxato. Incontinência urinária; indicado também no alívio sintomático da dor e na redução da frequência urinária causadas por perturbações inflamatórias das vias urinárias e na prevenção de espasmos vesico-uretrais resultantes de cateterização.
Valproato Sódio	Ácido Valpróico. Antiepiléptico e Anticonvulsivante. Utilizado na epilepsia. Tem acção sobre o humor nas psicoses maníaco-depressivas; útil na profilaxia da enxaqueca.
Varfine	Varfarina. Antivitaminico K. Anti-coagulante oral, na prevenção e no tratamento de trombozes das veias profundas e do tromboembolismo pulmonar e na prevenção do tromboembolismo em doentes com fibrilhação auricular ou submetidos a cirurgia das válvulas cardíacas.
Varison (escina)	Venotrópico, substâncias utilizadas no tratamento do insuficiência venosa.
Venlafaxina	Antidepressores / Inibidores selectivos da recaptção da serotonina e da noradrenalina. Indicado para a Depressão. Ansiedade generalizada.
Ventilan	Salbutamol. Agonista Adrenérgico Beta. Broncodilatador. Tratamento do broncospasmo na asma e na DPOC. Também usado no tratamento da bronquite crónica, do enfisema pulmonar com obstrução reversível e na prevenção do broncospasmo.
Viartril S	Glucosamina. Indicado em situações de doença osteoarticular degenerativa. A glucosamina é um aminomonossacárido natural precursor na síntese de glicosaminoglicanos e ácido hialurónico, dois componentes incluídos na formação da cartilagem articular, a administração exógena de glucosamina a animais, pode aumentar a síntese de proteoglicanos e reduzir a degradação da cartilagem.
Victan	Loflazepato de Etilo. Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos / Benzodiazepinas . Ansiedade e sintomas ansiosos.
Zolpidem	Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Tratamento a curto prazo da insónia.
Zyloric	Alopurinol. Profilaxia da gota e da litíase renal. Antigotoso. Actua inibindo de forma competitiva a xantinaoxidase, enzima que intervém na síntese do ácido úrico.

